

核准日期：2007年01月30日  
修改日期：2010年03月23日  
修改日期：2010年12月06日  
修改日期：2014年04月16日  
修改日期：2015年12月01日  
修改日期：2020年10月29日  
修改日期：2021年07月09日  
修改日期：2023年04月13日

# 盐酸昂丹司琼片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

## 【药品名称】



通用名称：盐酸昂丹司琼片


英文名称：Ondansetron Hydrochloride Tablets

汉语拼音：Yānhuā Àngdānsīqióng Piàn

核准日期：2007年01月30日

盐酸昂丹司琼。

1-二氢-9-甲基-3-[[2-(4-甲基咪唑-1-基)苯基]-4-(1H)-咪唑酮盐酸盐二水合物。



160 · HCl · 2H<sub>2</sub>O

白色片。

1.细胞毒性药物化疗和放射治疗引起的恶心呕吐；2.预防和治疗手术后的恶心呕吐。

160计)

的化疗药引起的呕吐：化疗前15分钟、化疗后4小时、8小时各静脉注射昂丹司琼注射液8mg，停止化疗以昂丹司琼片8mg（2片），连用5天。

太强的化疗药引起的呕吐：化疗前15分钟静脉注射昂丹司琼注射液8mg，以后每8~12小时口服昂丹司琼片天。

引起的呕吐：首剂须于放疗前1~2小时口服片剂8mg（2片），以后每8小时口服8mg（2片），疗程视放疗

后的恶心呕吐：在麻醉前1小时口服片剂8mg（2片），随后每隔8小时口服片剂8mg（2片）两次。

不适、便秘、口干、皮疹、偶见支气管哮喘或过敏反应、短暂性无症状转氨酶增加。上述反应轻微，无须特别治疗。并有胸痛、心律不齐、低血压及心动过缓的罕见报告。

盐酸阿扑吗啡联合用药时有严重低血压和意识丧失的报道，故本品禁止与阿扑吗啡联合使用。

胃肠抑制剂。

者，如服用洛哌啶醇、阿片类药物和抗酸剂。

交率，肝肾功能不全患者应慎用本品。本品为强效止吐药，且能引起低血压。因此，服用本品时，应避免同时服用其他强效止吐药。

本品，以免引起低血压和意识丧失。

本品，并具成瘾性。上市以来有报道显示，服用本品可能导致低血压和心动过缓。因此，服用本品时应避免使用昂丹司琼。如果出现低血压或心动过缓，应停止服用本品。本品的主要成分包括电解质

核准日期：2007年01月30日

【性状】

本品主要成份为

化学名称：2,3

化学结构式：

分子式：C<sub>16</sub>H<sub>16</sub>N<sub>4</sub>

分子量：365.86

【性状】

本品为白色或类

【适应症】

止吐药。用于：

【规格】

4mg（以C<sub>16</sub>H<sub>16</sub>N<sub>4</sub>

【用法用量】

1.对于高度催吐

后每8~12小时口服

2.对催吐程度不

8mg（2片），连用5

3.对于放射治疗

的疗程而定。

4.对于预防手术

【不良反应】

可有头痛、腹部

特殊处理。个别患者有

【禁忌】

由于昂丹司琼与

对本品过敏者。

【注意事项】

1.对胃肠蠕动减

2.对肝肾功能减

量每日口服不超过8mg

3.服用本品期间

4.服用本品期间

应避免同时服用

